



中心簡介

結直腸外科及腹腔鏡手術中心於2004年6月在中環成立首間醫務所，由資深的外科專科醫生為病人提供診症、腸胃內窺鏡檢查和手術服務。

位於中環和尖沙咀的手術中心面積逾千呎，聘用註冊護士，並設有獨立的檢查治療室。中心環境優雅舒適，設備完善，務求為病人提供高質素的服務。

腹腔鏡手術 (微創手術)

	傳統剖腹手術	腹腔鏡手術
傷口大小	13-18厘米 (約 5-7 寸)	½ -5厘米 (約1/5 - 2寸)
傷口疼痛	較大 要較多止痛藥	輕微
手術後禁食時間	3至5日	1日
住院時間	7至10日	3至7日
手術技巧	較簡單	較複雜
費用	較低	較高
治癌效果	與腹腔鏡 手術相若	與傳統剖腹 手術相若

表一：腹腔鏡手術與傳統剖腹手術的分別

總結

時至今日，腹腔鏡手術的技術已經相當成熟；並安全地應用在多種手術項目上，為病人減少痛苦之餘，同時提供高質素的醫療成效。

參考資料：

1. New England Journal of Medicine [新英倫醫學雜誌] 2004 : A comparison of laparoscopically assisted and open colectomy for colon cancer.



中環醫務所
☎ 2810 8818
● 畢打街1-3號
中環大廈1331室
(地鐵站G出口)



尖沙咀醫務所
☎ 2366 3881
● 堪當利士道8號
格蘭中心1304-5室
(地鐵站A2出口)

如有任何查詢，請致電到診所

認識腹腔鏡手術



圖一：腹腔鏡手術切口



圖二：剖腹手術切口

腹腔鏡手術（又稱微創手術）利用內視鏡，透過微小的傷口（圖一）進入身體內進行手術，代替了傳統剖腹所需的大切口（圖二）；故又稱為微創或鎖匙孔手術，至今已有二十多年歷史。

腸道疾病的應用

- 結直腸癌
- 潰瘍性結腸炎
- 疝氣（小腸氣）
- 闌尾炎（盲腸炎）
- 小腸腫瘤
- 結腸憩室
- 結直腸瘰肉

手術過程

醫生會先在肚臍對下開一個小切口，放入內視鏡（圖三）。腹腔內的影像會清晰地傳送到顯示屏上，讓外科醫生準確地進行手術（圖四）。透過幾個小切口，醫生可放進多種儀器輔助手術；當腫瘤被切除後，會經由其中一個切口取出，然後進行體內或體外腸道吻合。



圖三：內視鏡經小切口進入腹腔內



圖四：腹腔鏡手術進行中

手術的優點

- 傷口細少，痛楚輕
- 減少服用止痛藥
- 提早腸道康復
- 縮短住院時間
- 減低術後腸道黏連的風險

腹腔鏡手術與結直腸癌

在醫學上要衡量一種手術治療在治癌方面的成效，要視乎以下幾個因素：

- 所割除的腸道組織是否足夠
- 所割除的淋巴組織是否足夠
- 術後癌病復發率
- 術後五年存活率

根據以上因素，美洲、歐洲及香港進行過嚴謹的學術研究，比較傳統剖腹手術及腹腔鏡手術在醫治結直腸癌上的療效；結果一致，兩者成效相若，而腹腔鏡手術能縮短病者康復時間（表一）。

這些研究結果分別刊登在多份具影響性的國際醫學文獻，其中包括「新英倫醫學雜誌」¹。