

## 檢查過程

- 病人需向左側臥
- 護士會在病人喉部噴放局部麻醉藥以減少不適，然後請病人口含膠牙墊，使內視鏡能順利經過喉部進入食道
- 醫生會注射鎮靜劑，病人在熟睡情況下進行檢查
- 檢查時有儀器監察病人的血壓、心跳及血含氧量
- 檢查完畢後病人會迅速甦醒

## 檢查後注意事項

- 檢查後約20-30分鐘，待喉部麻醉藥的效力消失方可進食
- 如曾接受鎮靜劑注射，須休息待完全清醒後由家人或朋友陪同離開
- 檢查當天切勿飲酒、駕駛車輛、操作器械或簽署重要文件

www.colorectal.com.hk



### 中心簡介

結直腸外科及腹腔鏡手術中心於2004年6月在中環成立首間醫務所，由資深的外科專科醫生為病人提供診症、腸胃內窺鏡檢查和手術服務。

位於中環和尖沙咀的手術中心面積逾千呎，聘用註冊護士，並設有獨立的檢查治療室。中心環境優雅舒適，設備完善，務求為病人提供高質素的服務。



**中環醫務所**  
☎ 2810 8818  
📍 畢打街1-3號  
中建大廈1331室  
(地鐵站G出口)



**尖沙咀醫務所**  
☎ 2366 3881  
📍 堪富利士道8號  
格蘭中心1304-5室  
(地鐵站A2出口)

如有任何查詢，請致電到診所



結直腸外科及  
腹腔鏡手術中心  
COLORECTAL AND LAPAROSCOPIC  
SURGERY CENTRE

# 胃內視鏡檢查

## 認識胃內視鏡檢查

胃內視鏡是一條幼長的光導纖維內窺鏡(圖一)，外圍直徑為0.8厘米；經由口中引進入食道、胃至十二指腸部位；清晰的影像會即時傳送至螢光幕上(圖二、三)。醫生在檢查時，會進行幽門螺旋菌測試\*(圖四)；如發現食道、胃或十二指腸黏膜有病變，可即時抽取組織作化驗；其他治療包括上消化道出血、拮取異物及割除胃瘰肉。

## 可診斷的病症

- 食道癌
- 食道靜脈擴張
- 食道基質腫瘤
- 胃癌
- 胃炎或胃潰瘍
- 胃酸倒流引致食道炎
- 胃瘰肉
- 胃腸道基質腫瘤
- 十二指腸發炎或潰瘍
- 壺腹癌  
(胆管通入十二指腸的位置)

## 提示

如任何人仕身體出現以下的狀況，應當盡快進行胃內視鏡檢查：

- 吞下異物
- 吞嚥困難
- 持續嘔吐
- 嘔血
- 貧血
- 持續性上腹部不適
- 胸口有火灼感覺
- 胃酸倒流
- 排出黑色糞便
- 上腹部腫塊

## 檢查前的準備

- 檢查前六小時不可飲食
- 如對任何藥物有過敏反應，有服食糖尿藥、薄血丸或亞士匹靈等藥物，請預早通知醫生
- 檢查前須除下假牙、眼鏡和所有金屬物品
- 換上本中心提供的衣服



圖一：胃內視鏡



圖二：胃癌的影像



圖四：幽門螺旋菌測試



圖三：胃內視鏡檢查進行中

\* 幽門螺旋菌測試結果會於翌日通知病人